



HARİZMİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

Doküman Kodu	HB.FR.06
Yayın Tarihi	21.01.2021
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	13.08.2021
Sayfa Numarası	1

Tarih					Servis Adı					
Hastanın Adı Soyadı					Hastanın Yaşı					
Değerlendirme Gerekçesi:	1	İlk Değerlendirme	2	Post-op Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği	5	Durum Değişikliği

Parametreler	Risk Faktörleri	Puan	Y eniden Değerlendirme (T arih- Gerekçe Numarası)				
			İlk Değerlendirme
YAŞ	0-3 yaş	4	4	4	4	4	4
	4-7 yaş	3	3	3	3	3	3
	8-11 yaş	2	2	2	2	2	2
	12-18 yaş	1	1	1	1	1	1
DÜŞME ÖYKÜSÜ	Son 6 ay içerisinde de düşme öyküsü var.	2	2	2	2	2	2
HASTALIKLAR(Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge bozukluğu, Kooperasyon bozukluğu, Solunum hastalıkları, Senkop/baş dönmesi, Ajitasyon)	Hastalıklardan 1 veya 2 tanesi bulunmaktadır.	1	1	1	1	1	1
	Hastalıklardan 3 veya daha fazlası bulunmaktadır.	2	2	2	2	2	2
GÖRME DURUMU	Görme durumu zayıf (gözlük kullanıyor vb.)	2	2	2	2	2	2
	İleri derecede görme engeli var.	10	10	10	10	10	10
İLAC	Son 1 hafta içinde 1 veya daha fazla riskli ilaç kullanımı var.	2	2	2	2	2	2
İKİPMAN VARLIĞI (IV İnfüzyon, Solunum Cihazı, Kalıcı kateter, Dren, Perfüzör, Pacemaker vb.)	Hastaya bağlı 2 veya daha fazla bakım ekipmanı var.	2	2	2	2	2	2
YÜRÜME VE DENGE(Yürüteç, Koltuk değneği, Kişi desteği vb.)	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe ihtiyacı var.	10	10	10	10	10	10
SEDASYON/ANESTEZİ	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 24 saatlik dönemde	3	3	3	3	3	3
	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 48 saatlik dönemde	1	1	1	1	1	1
MENTAL DURUM	Oryantasyon bozuk (konfüze, disoryante, deliryum vb)	3	3	3	3	3	3
YAŞAM BULGULARI	Unstabil	3	3	3	3	3	3
DİĞER	Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.	2	2	2	2	2	2
	Ailenin düşme riski konusunda eğitim/bilgilendirme ihtiyacı var.	2	2	2	2	2	2

TOPLAM PUAN

HEMŞİRE NOTU (Hastanın düşme riski ile ilgili yukarıda bulunmayan önemli bir durum varsa belirtiniz)

RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU

Düşük Risk	0 - 9 Puan Arasında
Yüksek Risk	10 Puan ve Üzeri

Değerlendirmeyi yapan Hemşire Adı-Soyadı:

İmza:

NOT: Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.

* Harizmi Düşme Riski Ölçeği yalnızca çocuk (0-18 yaş arası) yatan hastalarda kullanılır.

Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.